

TIPOS FRECUENTES DE PICADURAS

Este tipo de picaduras no precisan de atención médica si no van mas allá del picor, dolor o hinchazón temporal.



MOSQUITO

La picadura típica de mosquito es una pápula (lesión sobreelevada) o un habón (lesión sobreelevada con hinchazón). Sólo produce picor. Si se sufre algún otro síntoma ya no es una picadura de mosquito común.



AVISPA Y ABEJA

Un habón (hinchazón) con inflamación, un pequeño punto central y dolor, bastante más doloroso que un mosquito.



CHINCHES

El caso de las chinches es particular, pues dejan picaduras en zigzag, de color rojizo y urticaria intensa asociada en algunas ocasiones.



PULGAS

Las picaduras de pulgas son similares a las de chinche, pues pican muchas veces en fila o grupo. Su forma es de roncha, y el picor es prácticamente instantáneo tras la picadura.



GARRAPATA

El caso de la garrapata es particular, pues el mismo insecto se queda clavado en la piel y se hincha de forma progresiva mientras va chupando la sangre de su huésped.



ARAÑA

Las picaduras de araña producen una mácula o mancha con dos pequeños puntos centrales, a veces llenos de líquido en su interior. En España son poco peligrosas, aunque la cicatrización puede ser lenta.